畜牧业应对暴雨高温天气工作提示

全国畜牧总站

近日，受台风“丹娜丝”与副热带高压影响，南方地区持续强降雨，华北、黄淮等地则持续高温闷热，部分地区还面临暴雨与高温交替出现、转换剧烈的天气过程。极端天气易引发圈舍损毁、畜禽热应激、饲料霉变等风险。为最大限度降低对养殖业的不利影响，保障畜禽健康和生产稳定，综合内蒙古、河南等地技术指导意见，特发布以下工作提示。

一、强降水期间应对措施

1. 加固修缮生产设施。全面检查并加固畜禽圈舍、大棚、仓库等，重点排查老旧和简易棚舍，严防坍塌。
2. 疏通场区排水系统。清理、疏通养殖场内外排水沟渠，确保畅通无阻。低洼地带养殖场须提前备足沙袋、抽水泵等防汛物资，必要时提前筑堤挡水。
3. 排查电气安全隐患。严格检查场内所有电路、配电设备、发电机及防雷接地装置，确保其安全有效。落实防漏电、防短路措施，必要时切断非必需电源。
4. 储备关键应急物资。提前储备足量饲料、常用兽药疫苗（如消毒剂、抗生素、抗应激药物）、应急设备（如发电机、手电筒、应急灯）、备用饮水设备以及必要维修工具。

5. 保障饲料安全储存。饲料须存放于地势高燥、通风良好的仓库，垫高堆放，严防受潮霉变。雨前检查仓库屋顶、门窗防水，雨后及时晾晒受潮饲料，霉变饲料坚决废弃、严禁饲喂。

6. 强化畜禽健康监测。加强巡查，重点关注呼吸道、消化道疾病和寄生虫病。发现异常立即隔离、诊断治疗，必要时上报当地畜牧兽医部门。

7. 加强牧区饲养管理。强降雨期间，牧区牛羊应减少放牧，避免天气剧变时无法归圈。加强对圈舍安全的检查，及时应对突发情况。

二、高温应对措施

1. 强化圈舍通风降温。最大限度开启门窗，同步采取降低循环水源温度、强化机械通风等辅助措施，如采用地下水替换高温循环水，或增加风机开启数量、延长运行时长，以此提升整体降温效果，确保畜禽养殖环境舒适。

2. 完善遮阳防晒设施。检查并修补圈舍遮阳网、凉棚，确保有效遮阳。露天或半开放式养殖场必须搭建足够遮荫棚。

3. 保障充足清洁饮水。增设饮水点位，确保 24 小时不间断供应清洁凉爽饮水。定期清洗水槽水线，防止生物膜形成和细菌滋生。

4. 加强热应激管理。在高温期间要保持饲养管理的相对稳定，应尽量避免转栏、断奶和更换饲料等可能引起畜禽应

激反应的操作。必要的群体管理（如疏散高密度饲养畜禽）应在早晚气温相对凉爽的时段执行，同时，在操作过程中要保持动作轻柔，减少不必要惊扰，最大程度降低管理活动对畜禽造成的不良影响。

三、高温高湿应激综合防控

1. 合理调整日粮结构。适当提高日粮蛋白水平和能量浓度，增加青绿多汁饲料、湿拌料，增进畜禽食欲。适当增加易消化、适口性好的饲料比例，减少高能高脂类饲料的比例。

2. 提前添加抗应激剂。暴雨高温天气易致畜禽出现应激反应。在落实降温措施的同时，可提前在饲料或饮水中添加抗应激添加剂（如维生素 C、维生素 E、电解多维、中草药制剂等）。

3. 严防霉变病原滋生。高温高湿极易诱发饲料霉变（即使先前未受潮）及病原微生物（细菌、霉菌）滋生。应加强饲料储存点检查，坚持先进先出。强化环境消毒，重点控制圈舍湿度，关键是做好通风管理。

4. 重点监护易感群体。应特别关注仔畜雏禽、怀孕母畜、病弱个体等易感群体，密切观察其行为表现，如呼吸急促、精神沉郁、食欲减退、扎堆等。发现异常应立即隔离，咨询兽医等专业技术人员，对常规疾病可进行针对性治疗，对传染病须防止扩散。